

9 ลักษณะอาการ เจ็บป่วยฉุกเฉิน




อาการเจ็บป่วยมีหลายระดับ อาการเจ็บป่วยทั่วไปที่สามารถดูแลตัวเองได้ ไปจนถึงระดับอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เกิดจากการได้รับบาดเจ็บ หรืออาการป่วยที่เป็นอันตรายต่อการดำรงชีวิตหรือการทำงานของอวัยวะสำคัญ จำเป็นต้องได้รับการประเมินและบำบัดรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันไม่ให้อาการรุนแรงของการบาดเจ็บเพิ่มขึ้น หรือเกิดการเสียชีวิต



หมดสติ ช็อก สะลึมสะลือ
เรียกไม่รู้สีกตัว



มีสิ่งแปลกปลอมอุดตัน
ทางเดินหายใจ



ช็อกเกร็ง ชักกระตุก



ตกเลือด เลือดออกทางช่องคลอด



โทร.
1669
ทันที



เจ็บหน้าอก
หายใจหอบเหนื่อย



ปากเบี้ยว
อ่อนแรงครึ่งซีกฉับพลัน



ปวดท้องรุนแรง




เจ็บท้องคลอต คลอตฉุกเฉิน



ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เช่น อุบัติเหตุการจราจร ตกจากที่สูง จมน้ำ ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ ได้รับสารพิษ สัตว์มีพิษกัดต่อย



อัตราการรอดชีวิต
ของผู้ป่วยฉุกเฉิน
เมื่อได้รับ
การปฐมพยาบาล



เรียบเรียงข้อมูลจาก

- “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับประชาชนทั่วไป”, ศูนย์กู้ชีพเรนเจอร์ โรงพยาบาลราชวิถี.
- “คู่มือปฐมพยาบาล (First Aid Manual)”, สภากาชาดไทย.

นิรนามการ เตรียมตัว รู้ สอด ภาค3 FIRST AID 03-60/No.02



ผลิตโดย
โครงการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park)
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ศูนย์กู้ชีพ “บนเรนทร์” โรงพยาบาลราชวิถี